

Výživa a životní styl v prevenci kolorektálního karcinomu

Kolorektálnímu karcinomu se dá, na rozdíl od spousty jiných onemocnění, v poměrně značné míře předcházet úpravou stravy a životního stylu. Stačí dodržovat několik zásad:

1) Udržet si ideální tělesnou hmotnost – obezita významně zvyšuje riziko vzniku karcinomu.



2) Konzumovat dostatečné množství vlákniny – které najdeme např. v celozrnných obilovinách a výrobcích, luštěninách, ovoci a zelenině, oříšcích, semínkách.



3) Snažit se zařazovat do jídelníčku spíše rostlinné oleje než živočišné tuky – např. řepkový nebo olivový olej místo másla nebo sásla. Také volit výrobky s nižší nebo střední tučností.



4) Nepřehánět to s konzumací červeného masa – tato masa (vevřové, hovězí, zvěřina, skopové aj.) by v jídelníčku rozhodně neměla převládat, stejně tak uzeniny.




4) Dbát na dostatečný příjem kyselin omega-3, které najdeme v tučných mořských rybách nebo rostlinných olejích.



5) Konzumovat potraviny s obsahem vápníku – např. neochucené mléko a mléčné výrobky s nižší nebo střední tučností, ale i brokolici, mák nebo třeba ořechy.



6) Vyhnut se nadměrné konzumaci jednoduchých cukrů – v podobě např. cukru, medu, sladkostí, ale i skrytých cukrů v pochutinách a polotovarech.



7) Dbát na dostatečný příjem tekutin – ideálně vody, neslazených minerálních vod a nebo čajů.



8) Dostatečně se hýbat ve volném čase – minimálně 3 hodiny týdně, nebo půl hodiny denně (rychlá chůze, běh, cvičení).

9) Nekouřit a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu – i kouření má velký vliv na tlusté střevo a v kombinaci s alkoholem se riziko vzniku karcinomu ještě zvyšuje. Maximální denní dávka je u mužů 0,5 l piva, 2 dl vína nebo 5 cl tvrdého alkoholu, pro ženy je dávka poloviční.



10) Chodit na preventivní prohlídky – zejména ve věku nad 50 let, kdy riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku prudce narůstá.



Více informací na www.vize.cz